

PAKKAUSSELOSTE

1. Scalibor vet 760 mg panta ja Scalibor vet 1 g panta

Scalibor vet 760 mg panta: Pieni- ja keskikokoisille koirille

Kaulan ympärille asetettava punkkipanta, 48 cm, 19 g

Scalibor vet 1 g panta: Suurikokoisille koirille

Kaulan ympärille asetettava punkkipanta, 65 cm, 25 g

Koirille

Tietoa käyttäjälle

Sisältää synteettistä pyretroidia, jolla on punkkeja ja hyönteisiä tappava vaikutus.

2. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

Yksi panta (48 cm, 19 g) sisältää:

Vaikuttava aine: deltametriini 4,0 % w/w eli 0,760 g.

Apuaineet: titaanidioksidi (E171), 0,285 g ja trifenyylifosfaatti 5,890 g.

Yksi panta (65 cm, 25 g) sisältää:

Vaikuttava aine: deltametriini 4,0 % w/w eli 1,000 g.

Apuaineet: titaanidioksidi (E171) 0,375 g ja trifenyylifosfaatti 7,750 g.

3. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Alankomaat

Valmistaja:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons,

FR-27460 Igoville

Ranska

Markkinointi:

Intervet Oy, Espoo

4. KOHDE-ELÄINLAJI

Koira

5. KÄYTTÖAIHEET

Punkkitartunnan (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) torjunta 5-6 kuukauden ajan.

Verta imevien hietasääskien (*Phlebotomus perniciosus*) torjunta 5-6 kuukauden ajan.

Estää aikuisia *Culex pipiens pipiens* -hyttysiä imemästä verta. Vaikutus kestää 6 kuukautta.

6. ANNOSTUS KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN

48 cm: n pituista pantaa käytetään pienille tai keskikokoisille koirille.

65 cm: n pituista pantaa käytetään suurikokoisille koirille.

Yksi panta koira kohti.

7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI

Vain ulkoiseen käyttöön.

8. OHJEET VALMISTEEN ANTAMISEKSI OIKEIN

Panta otetaan suojaussista ja asetetaan koiran kaulan ympärille siten, että pannan ja koiran kaulan väliin mahtuu kaksi sormeaa vierekkäin. Pannan toinen pää pujotetaan soljen läpi. Ylijäävä pannan osa leikataan pois siltä osin kun se ylittää 5 cm.

Koska panta saavuttaa täyden tehonsa viikon kuluttua, se tulisi asettaa yhtä viikkoa ennen kuin koira todennäköisesti altistuu punkeille. Pannan teho punkkeja ja hietasääskiä vastaan kestää noin 5-6 kuukautta.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa että koira pureskelee pantaa, sillä saattaa ilmetä seuraavia oireita: koordinoimattomia liikkeitä, vapinaa, kuolaamista, oksentelua ja takaruumiin jäykkyyttä.

Nämä oireet häviävät 48 tunnin kuluessa. Oireiden lievittämiseksi voidaan käyttää diatsepaamia mikäli tarpeen.

Pannan asettamisen jälkeen kädet on pestävä saippualla ja kylmällä vedellä.

Älä käsittele tätä tuotetta, jos olet allerginen trifenyylifosfaatille.

Älä anna lasten, varsinkaan alle 2-vuotiaiden, käsitellä pantaa, leikkiä sen kanssa tai laittaa sitä suuhun.

On huolehdittava siitä, etteivät pienet lapset ole pitkään kiinteässä kosketuksessa, esim. nuku, pantaa käyttävän lemmikin kanssa.

9. VASTA-AIHEET

Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille pennuille.

Ei saa käyttää koirilla, joilla on ihovaurioita.

Ei saa käyttää eläimille, joiden tiedetään olevan yliherkkiä pyretroideille.

Ei saa käyttää kissoille.

10. HAITTAVAIKUTUKSET

Harvinaisissa tapauksissa voidaan havaita paikallisia ihovaurioita, ihotulehdusta tai ihon punoitusta, kutinaa ja karvanlähtöä.

Erittäin harvoin on raportoitu neurologisia oireita kuten vapinaa ja väsymystä. Jos näitä haittoja ilmenee, tulisi panta poistaa. Nämä oireet häviävät yleensä 48 tunnin kuluessa.

Jos havaitset koirallasi muita haittavaikutuksia, kerro niistä eläinlääkärille tai apteekkiin.

Yksittäistapauksissa punkkeja saattaa kiinnittyä koiraan pannasta huolimatta, joten punkkien ja hietasääskien levittämien infektioitautien tartuntaa ei voida täysin sulkea pois.

11. VAROAIKA

Ei oleellinen, koska Scalibor-pantaa ei ole tarkoitettu tuotantoeläimille.

12. SÄILYTYSOLOSUHTEET

Suojaussiin pakattu panta on säilytettävä pahvikotelossa. Ei lasten ulottuville.

Ei saa käyttää pahvikoteloon ja pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

13. ERITYISVAROITUS

Teho ei heikkene, vaikka panta joutuisi satunnaisesti kosketukseen veden kanssa. Panta on kuitenkin irrotettava ennen koiran päästämistä uimaan. Vaikuttava aine on haitallinen kaloille, muille vedessä eläville eliöille ja mehiläisille.

14. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI JÄTEMATERIAALIN HÄVITTÄMISEKSI

Käytön jälkeen tai käyttämättä jäänyt panta tulee toimittaa apteekkiin tai ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi.

15. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

20.7.2006

BIPACKSEDEL

1. Scalibor vet 760 mg halsband och Scalibor vet 1 g halsband

Scalibor vet 760 mg halsband: För små och medelstora hundar

Halsband: 48 cm, 19 g

Scalibor vet 1 g halsband: För större hundar

Halsband: 65 cm, 25 g

För hund

Användarinformation

Innehåller syntetisk pyreteroid med verkan mot fästingar och insekter.

2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

1 halsband (48 cm, 19 g) innehåller:

Verksamt ämne: 4,0 % w/w dvs. 0,76 g deltametrin.

Hjälpämne: titandioxid (E171) 0,285 g och trifenyfosfat 5,890 g.

1 halsband (65 cm, 25 g) innehåller:

Verksamt ämne: 4,0 % w/w dvs. 1,000 g deltametrin.

Hjälpämne: titandioxid (E171) 0,375 g och trifenyfosfat 7,750 g.

3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nederländerna

Tillverkare:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons,

FR-27460 Igoville

Frankrike

Marknadsförare i Finland:

Intervet Oy, Esbo

4. DJURSLAG

Hund

5. INDIKATION(ER)

Bekämpning av infektion med fästingar (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) under 5 - 6 månader.

Bekämpning av blodsugande fjärilsmyggor (*Phlebotomus perniciosus*) under 5 - 6 månader.

Förebyggande av blodsugning från adulta myggor (*Culex pipiens pipiens*) under en tid av 6 månader.

6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

Det 48 cm långa halsbandet används till små och medelstora hundar.

Det 65 cm långa halsbandet används till större hundar.

Ett halsband per hund.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

För strikt utvärtes bruk.

8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Tag ut halsbandet ur skyddskuvertet och lägg det runt hundens hals så att två fingrar i bredd skall få plats mellan halsbandet och hundens hals. För in den fria ändan i spännet och klipp bort eventuellt överflödigt längd utöver 5 cm.

Eftersom halsbandet utövar sin fulla verkan efter en vecka bör det appliceras en vecka före det är troligt att hunden utsätts för fästingar. Halsbandet är verksamt mot fästingar och fjärilsmyggor under 5 - 6 månader.

I det osannolika fallet att hunden skulle tugga i halsbandet kan följande symptom uppträda:

okoordinerade rörelser, darrningar, salivering, uppkastning och stelhet i bakkroppen. Symptomen försvinner inom 48 timmar. För lindring av symptomen kan användas diazepam vid behov.

Efter applikation av halsbandet bör händerna tvättas med tvål och kallt vatten.

Hantera inte halsbandet ifall du är allergisk mot trifenylfosfat.

Tillåt inte barn, särskilt ej barn yngre än 2 år, att hantera, leka med eller sätta halsbandet i sin mun. Se till att små barn inte tillåts ha långvarig intensiv kontakt, t.ex. sova, med hund som bär halsbandet.

9. KONTRAINDIKATIONER

Skall ej användas till valp yngre än 7 veckor.

Skall ej användas till hundar med hudskador.

Skall ej användas till djur med känd pyretroid överkänslighet.

Skall ej användas till katter.

10. BIVERKNINGAR

I sällsynta fall kan lokala hudskador, hudinflammation eller rodnad av huden, klåda och håravfall förekomma. I mycket sällsynta fall har neurologiska symtom, såsom darrning och trötthet rapporterats. Ifall dessa biverkningar förekommer bör halsbandet avlägsnas. Dessa symtom försvinner vanligen inom 48 timmar.

Skulle en biverkan, som ej anges i denna bipacksedel, iakttas hos en hund, bör veterinär eller apotekare vidtalas.

I sällsynta fall kan fästingar påträffas trots att hunden bär halsbandet. Man kan därför, inte helt utesluta risken för överföring av fjärilsmyggs- eller fästingburen infektionssjukdom.

11. KARENSTID

Icke relevant, för Scalibor halsbandet är inte avsett för produktionsdjur.

12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Halsbandet i skyddskuvertet skall förvaras i kartongen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Användes före utgångsdatum angivet på kartongen.

13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Sporadisk kontakt med vatten minskar inte effekten hos halsbandet, men halsbandet bör tas av innan hunden skall bada. Det verksamma ämnet är skadligt för fisk, vattenlevande organismer och för bin.

**14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT
VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDEL ELLER AVFALL**

Efter användning eller ifall det blivit oanvänt skall halsbandet föras till apoteket eller till problemavfallscentralen för förstöring.

15. DATUM FÖR SENASTE ÖVERSYN AV BIPACKSEDELN

20.7.2006